

7. Pag-ani

Tingnan o magsampling sa taniman walong buwan makalipas itanim ang kamoteng kahoy kung maari ng anihin. Bunutin ang mga tanim nang manu-mano lalo sa lupang buhaghag. Sa lupang medyo matigas maaring gumamit ng bareta o taktak. Ibaon ito sa lupa upang magsilbing *lever*, o di kaya'y padaanan ng araro ang gilid ng halaman upang mabuhaghag ang lupa.



Ingatang hindi maputol o masugatan ang mga laman habang binubunot upang maiwasan ang dagliang pagkabulok nito.

Kung aanihin na manu-mano putulin muna ang tangkay ng halaman at mag-iwan ng kaunting bahagi mahahawakan sa pagbunot. Kung maari palipasin muna ang 3 hanggang 4 na araw bago bunutin ang tanim upang hindi kaagad masira ang mga laman pagkaani. Tanggalin ang mga laman sa tangkay gamit ang matalas na itak at tanggalin ang nakakapit na lupa gamit ang patpat na kahoy. Hugasan ang kamoteng kahoy at patuyuin sa hangin bago gawing chips kung gagawing arina bilang pagkain at kung gagawing pagkain sa hayop huwag na itong hugasan.

8. Paggawa ng chips, granules at flakes

Maaring gawing chips ang kamoteng kahoy gamit ang mekanikal na chipper o kaya ang matalas na itak. Mga 1/4 hanggang 1/2 pulgada ang kapal ng chips. Patuyuin ang chips sa init ng araw gamit ang trapal o kaya sa sementong biladan. Umaabot ng 2 araw ang ang pagpatuyo hanggang umabot sa 14% na moisture content. Maari din itong gawing granules 8-10mm ang kapal at sa flakes naman 2-3 mm ang kapal. May mabibili na ngayong mga mechanical granulator.

Inihanda ng Provincial Government
of Camarines Norte sa pamamagitan ng
Office of the Provincial Agriculturist.
Ito'y hango sa ginawang polyeto ng
Department of Agriculture RFO-V

Gabay sa Produksiyon ng Kamoteng Kahoy



Provincial Government of Camarines Norte
Office of the Provincial Agriculturist (OPAg)
Provincial Capitol Building, Daet, Camarines Norte
<https://opagcamnorte.com>
Facebook: OPAg Camarines Norte
Email: opagcamnorte@yahoo.com
Tel. No.: (054) 721-0291

Ang kamoteng kahoy o “*balinghoy*” ay isang pangmatagalang halaman. Ito ay may maraming gamit. Maliban sa pangsahog sa pagkain ng hayop maari din itong pagkunan ng *ethyl alcohol*. Napag-alaman na ang isang tonelada ng kamoteng kahoy makakagawa ng 180 litro ng *ethyl alcohol*. Maari itong itanim sa anumang uri ng lupa ngunit mas maganda ang tubo nito at mataas ang ani sa lupang buhaghag at mayaman sa organikong pataba. Maari din itong itanim sa panahon ng tag-ulan o tag-araw.



MGA REKOMENDADONG BARAYTI:

BARAYTI	GAMIT	ANI Toneladang laman bawat ektarya	BILANG ng buwan maani	KULAY ng laman	IBANG KATANGIAN
UPL Cv-1 Datu	Pang-industriyal	42	10	Puti	37% dry matter 29% starch
UPL Cv-2 Lakan 1	Pangkalahatang gamit	32	10	Dilaw	45% dry matter 33% starch
UPL Cv-3 Sultan 1	Pang-industriyal	56	10	Puti	35% dry matter 27% starch
UPL Cv-4 Vassourinha	Pangkalahatang gamit	30	10	Puti	38% dry matter 29% starch
UPL Cv-5 Sultan 2	Pang-industriyal	29	10	Puti	39% dry matter 28% starch
PSB CV-11 Lakan 2	Pangkalahatang gamit	29	10	Puti	33% dry matter 26% starch
PSB Cv-12 Lakan 3	Pangkalahatang gamit	31	8-10	Dilaw	35% dry matter 27% starch
PSB Cv-13 Lakan 4	Pangkalahatang gamit	31	8-10	Puti	36% dry matter 27% starch
NSIC Cv-17 Sultan 3	Pang-industriyal	40	10	Puti	35% dry matter
NSIC Cv-18 Sultan 4	Pang-industriyal	40	10	Puti	33% dry matter
NSIC Cv-20 Sultan 5	Pang-industriyal	34	10	Puti	33% dry matter 21% starch
NSIC Cv-25 Sultan 6	Pang-industriyal	39	10	Puti	35% dry matter 23% starch
NSIC Cv-26 Sultan 7	Pang-industriyal	38	10	Puti	35% dry matter 23% starch


1. Paghahanda ng lupa

Pumili ng lupang buhaghag na hindi natutuyuan ng tubig. Araruhin at suyurin ng isang beses ang lupa kung gagamit ng malaking traktora at dalawang beses kung gagamit ng kalabaw. Mag-tudling na may agwat na 75 sentimetro.

2. Pagtatanim

Kumuha ng mga pananim mula sa tangkay ng mga halaman na may walong buwang gulang pataas, walang sakit at walang tama ng insekto.

Putul-putulin ang mga tangkay sa habang 20-30 sentimetro bawat putol. Paghiwalayin ang mga pinutol na bahagi ayon sa parteng pinagmulan nito; isang grupo para sa mga pinutol mula sa pinakamababang bahagi ng tangkay, isa, para sa mga pinutol mula sa gitnang bahagi at isa, sa mga pinutol mula sa dulong bahagi ng tangkay. Sama-samang itanim ang bawat tangkay mula sa magkakatatulad na bahagi.



Ang tangkay na pinutol na naimbak sa malamig at malilim na lugar ay tatagal sa loob ng tatlong buwan, ngunit mas mainam pa rin gamitin ang sariwang pananim. Magtanim sa layong 75 x 75 sentimetro. Maaring itanim ito ng pahiga, patayo o medyo pahiga (pahiga angkop sa tuyong lupa o kung tag-araw; patayo na nakalitaw ang ikatlong bahagi angkop sa basang lupa o kung tag-ulan; medyo pahiga angkop sa katamtamang dami ng tubig sa lupa). Magtanim sa daang araro o tudling (*furrow*) kung tag-araw at sa bunton ng lupa (*ridge*) kung tag-ulan. Kailangan mag-ulit itanim sa mga bahaging hindi tumubo makalipas ang dalawang linggo pagkatanim.

3. Pag-aabono

Maglagay ng walong sakong 14-14-14 sa bawat ektarya; ang kalahati (apat na sako) ay ilagay sa araw ng pagtatanim (*basal*) ang natitirang kalahati (apat na sako) ay ilagay dalawang buwan pagkatanim bago tabunan ng lupa o gahukan ang mga puno ng halaman (*hilling-up*).

Maglagay ng abono 15 sentimetro mula sa puno ng halaman o ibudbud ito sa hanay ng mga halaman. Patubigan ang taniman upang matunaw ang abono.



Maglagay ng kompost o tuyong dumi ng hayop (50 sako sa bawat ektarya) habang inihahanda ang lupa upang maihalo ito nang husto sa lupa.

4. Pagpapatubig

Magpatubig kung tag-araw lalong-lalo na sa unang tatlong buwan pagkatanim at kung kinakailangan lamang sa tag-ulan.

5. Pagsugpo ng pesteng kulisap at sakit

Ang *Spider Mite* ang pinakamapinsalang pesteng kulisap ng kamoteng kahoy. Magbomba lamang ng angkop na kemikal kung kinakailangan ayon sa dami at tindi ng paninira ng pesteng kulisap.

Ang *Cassava Bacterial Blight* at *Cercospora Leaf Spot* ay kalimitang umaatake sa kamoteng kahoy. Gumamit ng mga pananim mula sa mga halamang walang sakit. Bunutin at sunugin ang mga may sakit na halaman.

6. Pagsugpo ng damo

Panatiliing walang damo ang taniman lalo na sa unang dalawang buwan pagkatanim. Padaanang araro ang taniman (*off-barring*) 3-4 na linggo pagkatanim at ulitin ito (*hilling-up*) 6-8 linggo pagkatanim. Iwasan ang pag-alis o pag-bunot ng damo 8 linggo pagkatanim para hindi maapektuhan ang paglalaman ng kamoteng kahoy. Tabasin na lamang ang mga matataas na damo.

